

YLEINEN VAARAMERKKI ILMOITTA SÄTEILYVAARASTA

MITEN TOIMIT SÄTEILYVAARATILANTEESSA

Säteilyvaarahälytys annetaan, jos viranomaiset mittaavat säteilyn annosnopeudeksi 100 mikrosievertiä tunnissa.

KUN YLEINEN VAARAMERKKI SOI,

TOIMI SEURAAVASTI:

1. Mene sisälle
2. Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihto
3. Kuuntele radiota
4. Toimi annettujen ohjeiden mukaan
5. Älä käytä puhelinta
6. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten lupaa

Viranomaisten saapuminen saattaa kestää jonkin aikaa, joten toimi rauhallisesti ja seuraa yrityksen/laitoksen suojelusuunnitelmaa ja radiosta annettuja ohjeita.

Seuraa säteilytiedottamista ja aloita väestönsuojan tai tilapäissuojan käyttökuntoon laitto, jos viranomaiset niin määräävät.

Huomioi:

- ilmoitus suojautumisesta
- toiminnan organisointi
- henkilöpuhdistus
- säteilyn annospäiväkirjanpito
- suojan säteilytilanteen tarkistus
- elintarvikkeet ja ensiapuvälineet

VIRANOMAISET ILMOITTAVAT, KUN VAARA ON OHI!

ALOITA YRITYKSESSÄ TAI LAITOKSESSA JATKOPUHDISTUSTOIMENPITEET ESIM. RADIOAKTIIVISEN LASKEUMAPÖLYN PUHDISTAMISEKSI.

NÄIN KÄYTÄT JODITABLETTIA

Joditabletteja otetaan vain viranomaisten kehotuksesta juuri tiettyinä ajankohtana ennen laskeuman saapumista. Viranomaiset antavat ohjeita yleisradion välityksellä.

Annostus:

- aikuisille ja yli 12 vuotiaille 1 tabletti
- 1-12 vuotiaille lapsille 1/2 tablettia
- 1 viikon ikäisille lapsille 1/4 tablettia

Tabletti otetaan kerta-annoksena mahdollisimman nopeasti ydinlaskeuman saapuessa. Myös raskaana olevat ja imettävät äidit voivat ottaa jodia kerta-annoksena. Joditabletteja ei saa ottaa, jos on jodiyliherkkyys tai kilpirauhasen toimintahäiriö.